

Was? Wo? Womit? Wann?

Spezielle Hygienemaßnahmen im leeren Stall

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Käfer | Fußböden und Wände bis 1m Höhe. Nicht in Futtertröge. | RAMBOSAL® K 1% | Sofort nach der Ausstallung im noch "warmen" Stall. |
| Einweichschaum | Stallfläche und Einrichtung | HarKo Schaum RE 2% | Vor dem Waschen. |
| Bakterien, Viren, Pilze, Kokzidien | Flächendesinfektion | INTERASK® 2,5 | Nach dem Waschen auf trockener Fläche. Ca. 0,4L/m ² fertige Lösung. |
| | | INTERKOKASK® 2-4% | |
| | | INTERCID® 1% | |
| | | INTERSTERIL® 1% | |
| | | INTERBAC® 1% | |
| Wasserhygiene, Tränkesysteme | Biofilm | Aqua-clean® 2-3% | Für 24 Stunden im leeren Stall. |
| | Kalkablagerung/ Biofilm | AQUASTERIL® 2% | |
| | Leerstandsdesinfektion | INTER® AQUADES 1% | Nach Reinigung bis Einstallung im System stehen lassen. Vorher spülen. |
| Bakterien (z.B. Salmonellen) | Futtersilos | INTERDES F® 1,5% | Mindestens 24 Stunden vor Neubefüllung. |

Vorbeugende Hygienemaßnahmen im belegten Stall

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|--|
| Wasserhygiene, Biofilm | Tränkewasser | Aqua-clean® 0,01% | Regelmäßig, nach Bedarf (alle 14 Tage nach Zugaben über das Trinkwasser) |
| Milben | Nester, Käfige | INTERMITOX® | Bei ersten Anzeichen des Befalls. |
| Insekten | Bevorzugte Plätze wie z.B. Fenster, Türrahmen, Wärmequellen | INTERFLYTOX® KÖDER | Bei ersten Anzeichen des Befalls. |
| | | INTERFLYEX® | |
| | | INTERFLYTOX® | |
| | | INTERFLYTOX® P | |

Allgemeine Hygienemaßnahmen

| | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--|
| Händedesinfektion | Antimikrobielle Händereinigung | INTERSOFT® D 5 ml | Nach Bedarf. |
| Bakterien, Viren | LKW, Geräte | INTERBAC® 1% | Nach jedem Transport/ jeder Benutzung. |
| Bakterien, Viren | Desinfektionswannen am Stalleingang | INTERBAC® 1% | Mindestens 1x wöchentlich erneuern. Je nach Verschmutzung. |
| Bakterien | Umkleide- und Sanitärräume | INTERDES F® 1,5% | Nach Bedarf. |
| Bakterien | Kleingeräte | INTERSPRAYDES® | Nach Bedarf. |
| Schadnager | Schlupfwinkel, Kot- und Futterplätze | INTERRATOX® | Solange, bis kein Fraß mehr festgestellt wird. |
| Bakterien, Viren | Vorplatz, Verladerrampe, Durchfahrtswanne | INTERCID® 1% | Nach jeder Ein-/ Ausstallung. |
| | | INTERBAC® 1% | |

Die Desinfektion ist nur nach einer gründlichen Reinigung und auf einer trockenen Fläche voll wirksam!

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.