

Was?	Wo?	Womit?	Wann?
------	-----	--------	-------

Spezielle Hygienemaßnahmen im leeren Stall

Käfer	Fußböden und Wände bis 1m Höhe. Nicht in Futtertröge.	RAMBOSAL® K 1%	Sofort nach der Ausstallung im noch "warmen" Stall.
Bakterien, Viren, Pilze, Kryptosporidien	Boden, Wände, Geräte, Decken, Liegeboxen, Inventar, Kälberhütten	INTERKOKASK® 2-4%	Nach gründlicher Nass-Reinigung. Futtertröge vor Belegung ausspülen.
Wasserhygiene	Tränkesysteme	Aqua-clean® 2-3%	Für 24 Stunden im leeren Stall.
Bakterien (z.B. Salmonellen)	Futtersilos	INTERDES F® 1,5%	Mindestens 24 Stunden vor Neubefüllung.

Vorbeugende Hygienemaßnahmen im belegten Stall

Wasserhygiene, Biofilm	Tränkewasser	Aqua-clean® 0,01%	Regelmäßig, nach Bedarf (alle 14 Tage nach Zugaben über das Trinkwasser)
Fliegen- und Rattenschwanzlarven	An die Randzonen von Laufflächen und Spaltenböden, Güllekanäle	INTERLARVTOX®	3 Tage nach Einstallung oder Entmistung. Nachbehandlung spätestens nach 2 Wochen. Wiederholung alle 4 Wochen.
Insekten	Bevorzugte Plätze wie z.B. Fenster, Türrahmen, Wärmequellen	INTERFLYTOX® KÖDER	Bei ersten Anzeichen des Befalls.
		INTERFLYEX®	
		INTERFLYTOX®	
		INTERFLYTOX® P	
Klauenpflege	Klauenbad	INTER® FORMALDEHYD nach Art. 95	Nach Bedarf.

Allgemeine Hygienemaßnahmen

Händedesinfektion	Antimikrobielle Händereinigung	INTERSOFT® D 5 ml	Vor bzw. nach dem Umkleiden.
Bakterien	Milchräume, Tanklager	INTERDES F® 1,5%	Nach jeder Reinigung.
Bakterien, Viren	LKW, Geräte	INTERBAC® 1%	Nach jedem Transport/ jeder Benutzung.
Bakterien, Viren	Desinfektionswannen am Stalleingang	INTERBAC® 1%	Mindestens 1x wöchentlich erneuern. Je nach Verschmutzung.
Bakterien	Umkleide- und Sanitärräume	INTERDES F® 1,5%	Nach Bedarf.
Bakterien	Kleingeräte	INTERSPRAYDES®	Nach Bedarf.
Schadnager	Schlupwinkel, Kot- und Futterplätze	INTERRATOX®	Solange, bis kein Fraß mehr festgestellt wird.
Bakterien, Viren	Vorplatz, Verladerrampe	INTERCID® 1%	Nach jeder Ein-/ Ausstallung.
		INTERBAC® 1%	

Die Desinfektion ist nur nach einer gründlichen Reinigung und auf einer trockenen Fläche voll wirksam!

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.