

Was?	Wo?	Womit?	Wann?
<b>Spezielle Hygienemaßnahmen im leeren Stall</b>			
Käfer	Fußböden und Wände bis 1m Höhe. Nicht in Futtertröge.	<b>RAMBOSAL®</b> 3%	Sofort nach der Ausstallung im noch "warmen" Stall.
Einweichschaum	Stallfläche und Einrichtung	<b>HarKo Schaum RE</b> 2%	Vor dem Waschen.
Bakterien, Viren, Pilze, Kokzidien	Flächendesinfektion	<b>INTERASK®</b> 2,5	Nach dem Waschen auf trockener Fläche. Ca. 0,4L/m <sup>2</sup> fertige Lösung.
		<b>INTERKOKASK®</b> 2-4%	
		<b>INTERCID®</b> 1%	
		<b>INTERSTERIL®</b> 1%	
		<b>INTERBAC®</b> 1%	
Wasserhygiene, Tränkesysteme	Biofilm	<b>Aqua-clean®</b> 2-3%	Für 24 Stunden im leeren Stall.
	Kalkablagerung/ Biofilm	<b>AQUASTERIL®</b> 2%	
	Leerstandsdesinfektion	<b>INTER® AQUADES</b> 1%	Nach Reinigung bis Einstallung im System stehen lassen. Vorher spülen.
Bakterien (z.B. Salmonellen)	Futtersilos	<b>INTERDES F®</b> 1,5%	Mindestens 24 Stunden vor Neubefüllung.

**Vorbeugende Hygienemaßnahmen im belegten Stall**

Wasserhygiene, Biofilm	Tränkewasser	<b>Aqua-clean®</b> 0,01%	Regelmäßig, nach Bedarf (alle 14 Tage nach Zugaben über das Trinkwasser)
Milben	Nester, Käfige	<b>INTERMITOX®</b>	Bei ersten Anzeichen des Befalls.
Insekten	Bevorzugte Plätze wie z.B. Fenster, Türrahmen, Wärmequellen	<b>INTERFLYTOX® KÖDER</b>	Bei ersten Anzeichen des Befalls.
		<b>INTERFLYEX®</b>	
		<b>INTERFLYTOX®</b>	
		<b>INTERFLYTOX® P</b>	

**Allgemeine Hygienemaßnahmen**

Händedesinfektion	Antimikrobielle Händereinigung	<b>INTERSOFT® D</b> 5 ml	Nach Bedarf.
Bakterien, Viren	LKW, Geräte	<b>INTERBAC®</b> 1%	Nach jedem Transport/ jeder Benutzung.
Bakterien, Viren	Desinfektionswannen am Stalleingang	<b>INTERBAC®</b> 1%	Mindestens 1x wöchentlich erneuern. Je nach Verschmutzung.
Bakterien	Umkleide- und Sanitärräume	<b>INTERDES F®</b> 1,5%	Nach Bedarf.
Bakterien	Kleingeräte	<b>INTERSPRAYDES®</b>	Nach Bedarf.
Schadnager	Schlupfwinkel, Kot- und Futterplätze	<b>INTERRATOX®</b>	Solange, bis kein Fraß mehr festgestellt wird.
Bakterien, Viren	Vorplatz, Verloaderampe, Durchfahrtswanne	<b>INTERCID®</b> 1%	Nach jeder Ein-/ Ausstallung.
		<b>INTERBAC®</b> 1%	

*Die Desinfektion ist nur nach einer gründlichen Reinigung und auf einer trockenen Fläche voll wirksam!*

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*