

Was?	Wo?	Womit?	Wann?
------	-----	--------	-------

Spezielle Hygienemaßnahmen im leeren Stall

Käfer	Fußböden, Volieren und Wände bis 1m Höhe. Nicht in Futtertröge.	CBM 8 MV 1%	Sofort nach der Ausstallung im noch "warmen" Stall.
Bakterien, Viren, Pilze, Kokzidien	Flächendesinfektion	INTERKOKASK® 4%	Nach dem Waschen auf trockener Fläche. Ca. 0,4L/m ² fertige Lösung.
Milben	Wände, Decken, Einrichtungen, Volieren.	INTER® BIOSILIKAT 15%	Nach der Desinfektion. Vor der Neubelegung.
Wasserhygiene, Tränkesysteme	Biofilm	Aqua-clean® 2-3%	Für 24 Stunden im leeren Stall.
	Kalkablagerung/ Biofilm	AQUASTERIL® 2%	
	Leerstandsdesinfektion	INTER® AQUADES 1%	Nach Reinigung bis Einstellung im System stehen lassen. Vorher spülen.
Bakterien (z.B. Salmonellen)	Futtersilos	INTERDES F® 1,5%	Mindestens 24 Stunden vor Neubefüllung.

Vorbeugende Hygienemaßnahmen im belegten Stall

Bakterien, Viren, Pilze	Boden, Wände, Geräte, Abrollgitter für Eier	INTERCID® 1%	wöchentlich
Wasserhygiene, Biofilm	Tränkwasser	Aqua-clean® 0,01%	Regelmäßig, nach Bedarf (alle 14 Tage nach Zugaben über das Trinkwasser)
Milben, Käfer	Umgebung der Tiere (Volieren, Kotkästen, Wände, etc.)	CBM 8 MV 1%	Bei ersten Anzeichen des Befalls.
Insekten	Bevorzugte Plätze wie z.B. Fenster, Türrahmen, Wärmequellen	INTERFLYTOX® KÖDER	Bei ersten Anzeichen des Befalls.
		INTERFLYEX®	
		INTERMISTOP MV	
		INTERFLYTOX® P	

Allgemeine Hygienemaßnahmen

Händedesinfektion	Antimikrobielle Händereinigung	INTERSOFT® D 5 ml	Vor bzw. nach dem Umkleiden.
Bakterien, Viren	LKW, Geräte	INTERBAC® 1%	Nach jedem Transport/ jeder Benutzung.
Bakterien, Viren	Desinfektionswannen am Stalleingang	INTERBAC® 1%	Mindestens 1x wöchentlich erneuern. Je nach Verschmutzung.
Bakterien	Eierraum, Sortieranlage, Kartonlager	INTERDES F® 1,5%	Täglich nach Arbeitsende.
Bakterien	Kleingeräte	INTERSPRAYDES®	Nach Bedarf.
Schadnager	Schlupfwinkel, Kot- und Futterplätze	INTERRATOX®	Solange, bis kein Fraß mehr festgestellt wird.
Bakterien, Viren	Vorplatz, Verladerrampe, Durchfahrtswanne	INTERCID® 1%	Nach jeder Ein-/ Ausstallung.
		INTERBAC® 1%	

Die Desinfektion ist nur nach einer gründlichen Reinigung und auf einer trockenen Fläche voll wirksam!

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.