

**Was?                      Wo?                      Womit?                      Wann?**

**Spezielle Hygienemaßnahmen im leeren Stall**

Käfer	Fußböden und Wände bis 1m Höhe. Nicht in Futtertröge.	<b>CBM 8 MV</b>	<b>1%</b>	Sofort nach der Ausstallung im noch "warmen" Stall.
Bakterien, Viren, Pilze, Kryptosporidien	Boden, Wände, Geräte, Decken, Liegeboxen, Inventar, Kälberhütten	<b>INTERKOKASK®</b>	<b>4%</b>	Nach gründlicher Nass-Reinigung. Futtertröge vor Belegung ausspülen.
Wasserhygiene	Tränkesysteme	<b>Aqua-clean®</b>	<b>2-3%</b>	Für 24 Stunden im leeren Stall.
Bakterien (z.B. Salmonellen)	Futtersilos	<b>INTERDES F®</b>	<b>1,5%</b>	Mindestens 24 Stunden vor Neubefüllung.

**Vorbeugende Hygienemaßnahmen im belegten Stall**

Wasserhygiene, Biofilm	Tränkwasser	<b>Aqua-clean®</b>	<b>0,01%</b>	dauerhaft
Fliegen- und Rattenschwanzlarven	An die Randzonen von Laufflächen und Spaltenböden, Güllekanäle	<b>INTERLARVTOX®</b>		3 Tage nach Einstallung oder Entmistung. Nachbehandlung spätestens nach 2 Wochen. Wiederholung alle 4 Wochen.
Insekten	Bevorzugte Plätze wie z.B. Fenster, Türrahmen, Wärmequellen	<b>INTERFLYTOX® KÖDER</b>		Bei ersten Anzeichen des Befalls.
		<b>INTERFLYEX®</b>		
		<b>INTERMISTOP MV</b>		
Klauenpflege	Klauenbad	<b>INTER® FORMALDEHYD nach Art. 95</b>		Nach Bedarf.

**Allgemeine Hygienemaßnahmen**

Händedesinfektion	Antimikrobielle Händereinigung	<b>INTERSOFT® D</b>	<b>5 ml</b>	Vor bzw. nach dem Umkleiden.
Bakterien	Milchräume, Tanklager	<b>INTERDES F®</b>	<b>1,5%</b>	Nach jeder Reinigung.
Bakterien, Viren	LKW, Geräte	<b>INTERBAC®</b>	<b>1%</b>	Nach jedem Transport/ jeder Benutzung.
Bakterien, Viren	Desinfektionswannen am Stalleingang	<b>INTERBAC®</b>	<b>1%</b>	Mindestens 1x wöchentlich erneuern. Je nach Verschmutzung.
Bakterien	Umkleide- und Sanitärräume	<b>INTERDES F®</b>	<b>1,5%</b>	Nach Bedarf.
Bakterien	Kleingeräte	<b>INTERSPRAYDES®</b>		Nach Bedarf.
Schadnager	Schlupwinkel, Kot- und Futterplätze	<b>INTERRATOX®</b>		Solange, bis kein Fraß mehr festgestellt wird.
Bakterien, Viren	Vorplatz, Verladerrampe	<b>INTERCID®</b>	<b>1%</b>	Nach jeder Ein-/ Ausstallung.
		<b>INTERBAC®</b>	<b>1%</b>	

*Die Desinfektion ist nur nach einer gründlichen Reinigung und auf einer trockenen Fläche voll wirksam!*

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*